

AstraZeneca COVID-19疫苗 施打建議事項

下列狀況不可施打AZ COVID-19疫苗：

1. 對疫苗所含成分(註)過敏者
2. 施打第一劑AZ COVID-19疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
3. 18歲以下青少年

下列狀況應暫緩施打AZ COVID-19疫苗：

1. 急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染

下列狀況者應謹慎評估施打之效益以及風險，再決定是否施打AZ COVID-19疫苗：

1. 血小板減少或任何凝血異常 (例如血友病) 者
2. 免疫功能不全者 (包括接受免疫抑制劑治療)
3. 懷孕或是可能懷孕之女性
4. 正在哺乳之女性

為預防以及及時處理施打後可能出現的過敏反應，應隨時備妥適當的醫療資源和監測措施，**疫苗接種後，建議密切觀察至少 30 分鐘。**

註：AZ COVID-19疫苗賦形劑組成如下：

- L-Histidine
- L-Histidine hydrochloride monohydrate
- Magnesium chloride hexahydrate
- Polysorbate 80
- Ethanol
- Sucrose
- Sodium chloride
- Disodium edetate (dihydrate)
- Water for injection

資料來源：食藥署